

PROFILASSI VACCINO COVID-19



Quella che segue è la **profilassi** consigliata per chi intende vaccinarsi per il Covid-19 e vale per qualsiasi tecnologia vaccinale.

Considerato “l’obbligo” vaccinale introdotto con il recente [Decreto Legge 1 aprile 2021 n.44](#), e considerata la possibilità di esonero prevista **dall’art. 4**, si consigliano a prescindere dalla volontà di fare o non fare il vaccino, i seguenti **esami ematochimici** (prelievo di sangue venoso) e **genetici** (semplice tampone buccale-test DNA), ricordando che i cosiddetti esami “pre-vaccinali” sono previsti dalla [Sentenza 258/1994 della Corte Costituzionale](#), che da sempre ne auspica la sistematica introduzione:

[EMOCROMO COMPLETO CON FORMULA + VITAMINA D + VITAMINA B12 + FOLATI + OMOCISTEINA + PROTEINA S LIBERA + D DIMERO + PROTEINA C ANTICOAGULANTE FUNZIONALE + TEST RESISTENZA ALLA PROTEINA C ATTIVATA + ANTITROMBINA III + FIBRINOGENO FUNZIONALE + PTT + PT + VES + PCR + SIEROLOGICO QUANTITATIVO COVID-19 \(IgG-IgM\), IgE TOTALI](#)

PANNELLO RISPOSTA INFIAMMATORIA:

AACT (-51 G-T rs1884082)
CRP (3872 G-A rs1205)
IL-1B (-511 C-T rs16944)
IL-1B (c.81 C-T rs1143634)
IL-6 (-572 G-C rs1800796)
IL-6 (-174 G-C rs1800795)
IL-10 (-1082 G-A rs1800896)
IL1RN (c.69 T-C rs419598)
IL6R (D358A A-C rs2228145)
IFNG (+874 A-T rs2430561)
TNFa (-308 G-A rs1800629)

METABOLISMO OMOCISTEINA:

MTHFR C677T (C-T rs1801133)
MTHFR A1298C (A-C rs1801131)

Invece per quanto riguarda i rimedi omeopatici da assumere qualora si facesse il vaccino:

THUJA MK DOSE UNICA GLOBULI (CEMON o HELIOS o REMEDIA), **UN CUCCHIAINO PRIMA DEL VACCINO** (QUANTO PRIMA NON IMPORTA, GIORNO PRIMA O ANCHE APPENA PRIMA);

SULFUR MK DOSE UNICA GLOBULI (CEMON o HELIOS o REMEDIA), **UN CUCCHIAINO DOPO IL VACCINO** (MEGLIO APPENA DOPO E PRENDERLO APPENA POSSIBILE).

N.B. Per motivi di efficacia e di qualità, si consiglia di ordinare il rimedio in **globuli** dalla **CEMON**, **SODINI**, **HERING** o dalla **HELIOS** o dalla **REMEDIA**.

Per ordinare i rimedi HELIOS indicare "1M granules, formato 4g o 8g"

<https://www.helios.co.uk/shop/thuja-occidentalis>

<https://www.helios.co.uk/it/negozi/sulphur>

Per ordinare i rimedi REMEDIA indicare "globuli 1M, formato 1g o 10g"

<https://omeopatia-remedia.it/shop/Sulfur/a9008180>

<https://omeopatia-remedia.it/shop/Thuja-occidentalis/a9008457>

Per ridurre le reazioni avverse possibili e per aumentare l'efficacia della dose vaccinale, si consiglia di iniziare **21 giorni prima del vaccino** ad assumere i seguenti integratori, come di seguito indicato:

- ***Immuno fee e Disbio fee (Cemon) , 21 gocce di entrambi da assumere in un pochino di acqua (magari leggermente calda per far evaporare l'alcol contenuto), la mattina a digiuno, per i 21 giorni precedenti la dose vaccinale, 7 giorni di stop, e altri 21 giorni.***
- ***MultiNatural o NutriMax (Nutrigea), 1 bustina o 2 capsule al mattino a digiuno per i 21 giorni precedenti la dose vaccinale, e per i 21 giorni successivi***
- ***KlamExtra (Nutrigea), 1 bustina al mattino a digiuno per i 21 giorni precedenti la dose vaccinale, e per i 21 giorni successivi***

Riferimenti

doi: [10.15761/CCRR.100023](https://doi.org/10.15761/CCRR.100023)

doi: [10.1371/journal.pone.0144832](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0144832)

doi: [org/10.1155/2018/6539548](https://doi.org/10.1155/2018/6539548)

doi: [10.1586/erv.12.134](https://doi.org/10.1586/erv.12.134)

doi: [org/10.1007/s00251-015-0864-z](https://doi.org/10.1007/s00251-015-0864-z)

doi: [org/10.1007/s13167-017-0101-y](https://doi.org/10.1007/s13167-017-0101-y)

doi: [org/10.1136/gut.48.6.748](https://doi.org/10.1136/gut.48.6.748)

doi: [10.1086/656236](https://doi.org/10.1086/656236)

doi: [10.1136/bmj.318.7177.193](https://doi.org/10.1136/bmj.318.7177.193)

doi: [org/10.1186/1471-2172-13-25](https://doi.org/10.1186/1471-2172-13-25)

doi: [10.1113/jphysiol.2004.067876](https://doi.org/10.1113/jphysiol.2004.067876)

doi: [org/10.1515/med-2020-0407](https://doi.org/10.1515/med-2020-0407)

doi: [10.1097/MD.0000000000004013](https://doi.org/10.1097/MD.0000000000004013)

doi: [10.1016/j.ejmg.2014.10.004](https://doi.org/10.1016/j.ejmg.2014.10.004)

doi: [10.1161/CIRCULATIONAHA.114.013311](https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.114.013311)

doi: [10.1111/head.13044](https://doi.org/10.1111/head.13044)

doi: [10.3325/cmj.2008.1.39](https://doi.org/10.3325/cmj.2008.1.39)

doi: [10.1016/j.ijbiomac.2018.11.176](https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2018.11.176)

doi: [10.1111/j.1538-7836.2005.01141.x](https://doi.org/10.1111/j.1538-7836.2005.01141.x)

doi: [10.1002/cbf.3019](https://doi.org/10.1002/cbf.3019)

doi: [10.3945/jn.110.124461](https://doi.org/10.3945/jn.110.124461)

doi: [10.7417/T.2015.1875](https://doi.org/10.7417/T.2015.1875)

doi: [10.1024/0300-9831.79.2.117](https://doi.org/10.1024/0300-9831.79.2.117)

doi: [10.1016/j.scitotenv.2020.142768](https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.142768)

doi: [10.1097/MCG.0000000000001112](https://doi.org/10.1097/MCG.0000000000001112)

doi: [10.1007/5584_2018_246](https://doi.org/10.1007/5584_2018_246)

doi: [10.1002/rmv.2032](https://doi.org/10.1002/rmv.2032)

Boger C M	<i>Repertory of Symptoms of ovaries, Homoeopathic Physician, volume Dec. 1895.</i>
Bönninghausen C M	<i>Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht-antipsorischen Arzneien with handwriten annotations, 1833.</i>
von	
Clarke J H	<i>A Dictionary of Practical Materia Medica, 1900.</i>
Hahnemann S	<i>Reine Arzneimittellehre 3 Aufl. 1.Tl 1830 2.Tl 1830, 1830.</i>
Mezger J	<i>Gesichtete Homöopathische Arzneimittellehre, 1951.</i>

Kent J T *Repertory 6th Ed.*, 1957.

Knerr C B *Repertory of Hering's Guiding Symptoms*, 1896.

N.B. Per scaricare altri documenti utili e importanti, invito ad iscriversi al **canale Telegram**:

<https://t.me/dottorOH>

N.B. Per dubbi o domande eventuali:

dottoroh@gmail.com

N.B. Si ricorda, ovviamente, che gli esami inseriti sopra sono indicativi, seppur completi e molto specifici relativamente a un ipotetico esonero, non contemplano tutte le problematiche individuali (ad es. nel caso di morbo di Crohn va anche indagata la presenza di mutazione del [gene NOD2/CARD15](#)); quindi eventuali altri esami integrativi vanno decisi assieme al proprio medico in base alla storia clinica anamnestica personale.

(c) 2021 - Dott. Diego Tomassone M.D.

Medico chirurgo clinico e ricercatore